

Otkriće o vakcinama – Dr. Andrew Moulden

Vakcine izazivaju imuni odgovor koji je okidač za smanjeni protok krvi u tijelu i mozgu, uzrokujući ishemijske udare, rezultirajući bolestima od autizma do iznenadne smrti (SIDS-a)

Nisam shvatio važnost otkrića dr. Andrew Moulden-a o preciznim mehanizmima vaskularnih oštećenja koje uzrokuju vakcine, i kako je lahko vidjeti dokaz ovih oštećenja u očima i licu oštećene djece, sve do prije nekoliko sedmica kada sam pregledao njegova nevjerovatna predavanja naziva „Tolerance Lost“, i pročitao neke od njegovih tekstova. Iznenaden sam dubinom njegovog rada, kao i shvatanjem da samo vrlo mali broj ljudi zna bilo šta o njegovim otkrićima. Ovaj tekst će samo ukratko opisati temelje ovog otkrića, ali trebate da razumijete detalje, tako što ćete analizirati fotografije djece. Analizom fotografija, odnosno očiju kod djece otkriti ćete promjene u simetriji očiju (da li su oči sinhronizovane pri pokretima očiju i pogledu), kao i pokretima očnih kapaka. Kao i analizom pokreta lica (pri osmijehu) i usta kod djece. Ovu analizu uradite prije i poslije vakcinacije. Nekada u roku nekoliko sati nakon primanja vakcine (ili više njih), ćete vidjeti ove promjene. Onda ćete shvatiti kako je važno i duboko znati za ovo otkriće za svakog roditelja, koji je naveden ili prisiljen od strane pedijatra, doktora, škole isl. da vakciniše svoje dijete. U trenutku kada se injektuje strana supstanca (putem bilo koje vakcine) u organizam,

tijelo odmah pokreće imuni odgovor na stranu supstancu (koja nije dio našeg tijela) ili tzv. antigen u vakcini. Ovaj imuni odgovor uključuje mobilizaciju bijelih krvnih zrnaca (zeta potencijal), što uzrokuje da se crvena krvna zrnca grupišu u grupe zajedno kao gomila novčića. Ovo grupisanje crvenih krvnih zrnaca usporava protok krvi, kroz proces koji se zove „grušanje“, i ponekad blokira protok krvi u cjelosti kroz mikrositne kapilarne sudove. Mikro sitni kapilarni sudovi dostavljaju kisikom bogatu krv u kritična područja mozga, uključujući i 12 kranijalnih nerava koji kontrolišu sve pokrete na licu i pokrete očiju. Smanjenje ili blokada (zastoj) dostave kisika ćelijama se naziva ISHEMIJA, ili češće UDAR. Ishemija izazvana vakcinama može se desiti bilo gdje u tijelu. Ali ishemija u mozgu može izmijeniti nervne impulse koji kontrolišu mišiće pokreta očiju, i mišiće koji kontrolišu pokrete u području lica i oko usta, i tako uzrokujući parcijalnu paralizu ili oduzetost. Ova parcijalna paraliza u pokretima očiju, simetriji očiju, ili pokretima usta je lahko vidljiva ako pogledate pažljivije fotografije vakcinisane djece, prije i poslije primanja vakcine, pa čak i kod odraslih osoba. Medicinska struka je ovaj vakcinama izazvan fenomen ishemije i imunog odgovora, nazvala različitim bolestima i poremećajima. Tu ulaze stanja od autizma do iznenadne smrti djeteta (SIDS – sudden infant death syndrome). Jednom kada shvatite značaj informacija iznešenih u ovom tekstu, nećete više nikada pristati na vakcinaciju, ili dopustiti da vaše dijete bude vakcinisano za bilo šta, ako brinete o njemu i želite ga zaštititi. Roditelji moraju shvatiti da sve vakcine izazivaju veliku (nemjerljivu) štetu, doživotna oštećenja i ponekad smrt za milione ljudi širom svijeta, kojima ništa nije rečeno i ništa ne sumnjaju. Laži i obmane da su vakcine sigurne i efektivne, promovisane od farmaceutske industrije i njenih

poslušnih i pratećih lidera u konvencionalnoj medicini moraju doći kraju od informisane, svjesne i oprezne javnosti.

„Vakcine uzrokuju autizam, mnoge neurodegenerativne poremećaje, sindrom iznenadne smrti djeteta, navodni sindrom trešenja djeteta, mnoge idiopatske poremećaje, napade, poteškoće pri učenju, gardasil reakcije i smrt, sindrom gulf war, poremećaje govora, poremećaje pažnje, tihe ishemijske udare, ugruške krvi i mnogo drugog za mnoge organe u tijelu.“ (Dr. Andrew Moulden).

Zeta potencijal

Zeta potencijal je skraćenica od elektrokinetički potencijal u koloidnim sistemima. U sistemu cirkulacije ovaj efekat, koji se zove MASS (po dr. Andrew Mouldenu, M-Moulden, A-Anoksija, S-Spektar, S-Sindrom), ima nekoliko okidača, kako god, mehanizam bolesti i poremećaja je isti bez obzira na okidač. Čak i kapilari (najmanji krvi sudovi) imaju svoje vlastite, sitne krvne sudove zvane „vasa vasorum“. Ako je protok krvi spriječen onda su ovi sitni krvni sudovi od krvnih sudova (vasa vasorum) prvi izloženi hipoksiji (odumiranju usljed nedostatka kisika). Protok krvi na mikroskopskom nivou je krucijalan za dobrobit i zdravlje, za sve sisteme organa u tijelu i za sva oboljenja. Zeta potencijal je jedna od glavnih sila, snaga, koja posreduje između interakcija čestica. Čestice sa visokim zeta potencijalom istog elektriciteta, pozitivnog ili negativnog će se odbijati jedne od drugih. Za molekule i čestice koje su dovoljno sitne i niske gustoće da ostanu nezavisne, visoki zeta potencijal će im dati potrebnu stabilnost da ostanu raspršene i pruže otpor grupisanju i

skupljanju jednih sa drugima. Intenzivne infekcije ili mikrobi i njihovi agenti uzrokuju smanjenje zeta potencijala koji mijenja krv ka zgrušavanju. Uvođenje sve više vakcina vremenom povećava ovaj efekat i tako povećava količinu vaskularne koagulacije i zgrušavanja krvi. Upotreba aluminijuma i aluminijumskih soli da stabilizuju vakcine pogoršava efekat zgrušavanja i povećava ga za do 6000 puta. Kod osoba sa visokim zeta potencijalom u krvi, imuni izazov može uzrokovati samo lokalno grupisanje i smanjenje zeta potencijala. U drugim slučajevima, može rezultirati ugrušcima u mikro-kapilarima, smanjujući ili uništavajući funkcije organa u tijelu, koje su klinički vidljive, ali i u tihom nevidljivom procesu. Zeta potencijal se mijenja kao dio MASS procesa i poremećaja mozga i ponašanja povezanih sa tim. Tu ulazi širok raspon poremećaja: neuropsihijatrijskih, neuromotornih, neurokognitivnih, neurosenzornih, kao i drugih patoloških stanja organa. Jer je položaj i stepen mikrovaskularnih oštećenja nepredvidiv, i efekat može početi samo kao trenje, i kroz daljnje smanjenje zeta potencijala može izazvati ugrušak ili krvarenje.

Navodni sindrom trešenja djeteta – promjena u krvi, uzrokovana vakcinama nastalom mikro-vaskularnom ishemijom je odgovorna za mnoge nepravedne osude navodnih „zlostavljanja djeteta“, nazvanih „sindrom trešenje djeteta“. Kako dolazi do gubitka dotoka kisika do tkiva i organa kroz krv, dolazi do uzbrzanja napada (epileptičnih) kod djece, koji se mogu desiti tokom spavanja. Kako bebine unutrašnje strukture lobanje (linije) nisu još kalcificirane, faze napada mogu izazvati frakture, i frakture po linijama uzduž kosti, što može biti pokazatelj kao da je dijete zlostavljano. Ako roditelj dovede dijete u hitnu pomoć, x-ray zrake mogu pokazati višestruke frakture različitog

stepena zarastanja, što implicira zlostavljanje, a ustvari to su karakteristike refleksije štetnih efekata vakcinacije ili infekcijskih bolesti. MASS i nizak zeta potencijal mogu postići isti efekat kao i trešenje djeteta.

Aluminijum koji pogoršava neurokognitivne funkcije, kao dodatak vakcini je u srži patoloških plakova i povezan je sa promjenama u ljudskom mozgu, kod pacijenata sa alchajmerovom bolešću. Soli aluminijuma su nespecifični izazivači imunog sistema i koriste se u svim vakcinama. Preko 20% svih umrlih sa alchajmerovom bolešću pokazali su mikro-vaskularne lezije u mozgu u posmrtnim obdukcijama. Ova mikro-vaskularna oštećenja (mini mikro udari), su klinički bili tihi tokom života pacijenata. Ova situacija se nimalo ne razlikuje od spektra autizma, parkinson bolesti, poteškoća pri učenju, poremećaja pažnje, smrti od gardasila, sindroma gulf war, šizofrenije i drugih morbidnih patoloških stanja. MASS unutarvaskularni proces grušanja i proces izliječenja tkiva i organa dešava se kod većine (ako ne i svih) poremećaja stečenih vakcinama, čak i u privremenim i izolovanim epizodama. Oštećenja kao što je alchajmerova bolest su kumulativna, iako ne nužno progresivna. Čak i reakcije na koži se mogu javiti odmah i nastaviti kroz niz od 7 ili 8 godina kasnije od vremena primanja vakcine, ili se ne pojaviti nikako sve do 1 pa do 6 godine kasnije. Ovo se dešava kod svih sisara koji prime vakcine. Postoji oko 7000 referenci o toksičnosti aluminijuma.

Imunološki gubitak tolerancije i povratak

Unošenje bilo koje bakterije ili bakterijskih filtrata bilo živih ili mrtvih (kao u vakcinama) izaziva reakciju tijela koja rezultira krvnim ugrušcima od jake mikrobne akcije i smanjuje zeta potencijal. Ovi ugrušci mogu biti male adhezije (trenja), koje se zakače za krvne sudove ili organe pogoršavajući i ometajući njihovu funkciju, ili kompletnu blokadu-opstrukciju, dovodeći do smrti organa. Oni su vrlo česti u bubrezima, plućima, jetri i mozgu. MASS fenomen je sada objašnjen kroz mikrobiološke procese, faze, i stanja koja se kasnije sakriveno aktiviraju i izazovu oboljenja kod svih sisara. Tu spadaju hronična oboljenja, poremećaji, smrt, spektar autizma uzrokovan vakcinama, sindrom iznenadne smrti i oboljenja mnogih organa i funkcionalnih poremećaja.

Globalna vakcinacija – profitabilni koktel za svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO);

Čineći stvari još gorim, svaka strana supstanca, mrtva ili živa, dodana u vakcine, uključujući aluminijum, živu, formaldehid, ljudske i životinjske ćelije i zagađivače, svaka od ovih izaziva i okida MASS odgovor sama po sebi. U tome je obim i veličina MASS-a da odredi bolesti. MASS je aditivan i kumulativan i ima imunološku memoriju. Jačina MASS-a i posljedica je više u imunološkom punjenju u datom trenutku, nego u specifičnom „patogenu“ koji se injektira. Globalne štete vakcinacije su zapanjujuće.

Primjer rubele i intravaskularne koagulacije

Autopijski izvještaji beba starih 13 sati kao i 11 mjeseci predstavljeni su kako slijedi. Ovo su slučajevi iz 1964. godine (male boginje). Autopsija pokazuje jasnu intravaskularnu koagulaciju (zgrušavanje) od ovih „patogena“ koja se prostire kroz sve sisteme organa. Efekat se može pojaviti nakon nekoliko mjeseci poslije. Ovo je zeta potencijal u akciji. Ovo pokazuje kako patogeni oštećuju, paralizuju i ubijaju. To znači da ovi isti patogeni, bilo da su ubijeni ili umrtvljeni uzrokuju iste probleme, čak i u umrtvljenoj formi, kada ih ubrizgavamo sada sa programima vakcinacije. Generalnom autopsijom je pronađeno: dufizna vaskularna oštećenja – pogođeni su svi organi i sistemi. Ovo su bile klinički neprimjetne ishemijske lezije, uključujući i lezije mozga. Mnoga od ove djece su bila oštećena u razvoju i autistična. Kao što to isto danas rade vakcine, ne samo MMR, već sve vakcine. Sada smo otkrili da se ove neurovaskularne lezije pojavljuju satima i danima poslije primanja vakcina. Svi patogeni (pronađeni u vakcinama), DTaP, gardasil, antraks, MMR, hepatitis, grip isl., izazivaju iste ishemijske lezije kroz čitav život, i kroz razne medicinske dijagnoze. Ovo je opšti, generični, nespecifični odgovor na bilo koji imuno izazov i nije uzrok pojedinačna klica (mikrob). Ovo znači da je jedino „sigurno“ ne vakcinisati!

1) Mikroskopska intravaskularna koagulacija (mikrokapilarno zgrušavanje), 2) Stanja anoksije (nedostatak kisika u krvi i tkivima), 3) MASS, i 4) Nizak zeta potencijal, - uzrokuju oboljenja, kao odgovor kada bilo šta što je „strano“ tijelu uđe u tijelo, pod uslovima imune hiperstimulacije. Strane supstance koje se odvoje u tkivima, i ne mogu biti uklonjene na lahak način kroz normalne imunološke procese. One

postaju fokalne (fokusne) tačke za neprekidne nespecifične imunološke borbe i akcije u tom području. Dakle, ako sve vakcine imaju iste ili slične posljedice, odnosno kada sve vakcine i infektivne bolesti naprave iste patološke simptome kod svih ljudi, onda to NIJE patogen ono što uzrokuje bolesti. Tačnije, bolest nastupa kao opšti odgovor na nespecifični imunološki izazov.

MASS ishemija

Spektar autizma i poteškoće pri učenju su zajedno isti pokazatelji stepena i širine povreda mozga, od istog vakcinama izazvanog MASS procesa. I to rade sve vakcine. Ovo je razlog zašto sve vakcine uzrokuju epidemiju neurodegenerativnih poremećaja, a to uključuje:

1 na svako 6 djetete ima specifičan poremećaj pri učenju;

1 na 87 djece (danas 1 na 50) ima autizam, nekad je bilo 1 na 10000 djece;

1 na svako 9 djetete ima astmu;

15% djece ima poremećaj nedostatka pažnje (ADD);

1-2% incidenca iznenadne smrti djeteta (SIDS);

1 od 4 gulf war veterana pati od gulf war sindrom (250,000 od 800,000 vakcinisanih), također 42,000 mrtvih sa rastom smrtnosti;

10,000 i više štetnih reakcija na gardasil vakcinu (vakcina protiv raka grlića materice), i preko 21 smrtni slučaj, uključujući udare i zgrušavanja krvi;

MASS je isti mehanizam kod Merck-ovog viox-a koji uzrokuje udare (sada sa preko 140 izvještaja smrti).

Svaka iritirajuća supstanca koja je injektovana u tijelo proizvodi iste simptome (oticanje adrenalnog korteksa – kore, atrofija – propadanje timusa – grudne žlijezde, čirevi želuca i duodenuma itd.) Ovo se dešava zbog ulaska strane supstance u tijelo i krvotok kod svih sisara. Bez obzira na vrstu vakcine, određene klice ili patogena, neurološka i

neurovaskularna oštećenja su ista za sve sisare (isti obrazac oštećenja). Ovo je generički, opšti odgovor imunog sistema sisara na stranu supstancu koja biva injektovana u tkiva i krv sisara.

Izazivanje tolerancije

Jedini razlog zašto je urođena forma rubele štetna, je zato što infekcija u prvom tromjesječju stavlja imuni sistem u stanje imune tolerancije. Imuna tolerancija uzrokuje disproporcijalno povećanje nespecifičnog imunog odgovora kao oružja u obliku antitijela, posebno ključnih antigena (specifični proteini koji prepoznaju patogene kao stranca) koji su isključeni ili izbrisani. Ovo znači, da će antitijela biti kao metci, ali će biti bezvrijedni, nikada neće opaliti. Zbog ovog razloga neki istraživači (kao A. Wakefield, 1997.) su povremeno nalazili sojeve klica iz vakcina u crijevima autistične djece. Imuni sistem biva parcijalno paralizovan u sposobnosti da uništi i eliminiše klicu odnosno mikrob. Kako god, nije mikrob ono što izaziva oboljenje, nego je to hiperaktivni nespecifični odgovor bijelih krvnih zrnaca na mikrobe koji uzrokuje bolesti i specifična funkcionalna iskliznuća (poremećaji) organa u tijelu.

Imuna tolerancija je prilagođeni imuni odgovor tijela u pokušaju da smanji pojavu autoimuniteta. Imuna tolerancija, jednom izazvana, postaje okidač za kolateralnu štetu ćelija, tkiva i organa koja nastaje hipoksijom (smanjenjem kisika). Oštećenja, bolesti i poremećaji koji se pojavljuju su odraz hiperstimulisanog imuno odgovora bijelih krvnih zrnaca. Ovo je tzv. „prijateljska vatra – pucanje i borba“, i kolateralna oštećenja kroz cijelo tijelo nastaju od ove borbe na mikroskopskom

nivou. SVE VAKCINE IZAZIVAJU RAT KROZ CIJELO TIJELO. Sve ponavljane vakcine imaju sklonost da izazovu imunu toleranciju. Sve vakcine izazivaju imuni odgovor u obliku bijelih krvnih zrnaca. Ovaj nespecifični odgovor i skrivena oštećenja tkiva, organa i tijela, se povećavaju odnosno rastu u obimu i širini sa svakom sljedećom vakcinom, iako bivaju klinički neprimjetna. Ovo je MASS odgovor u fiziologiji. To uzrokuje smrt, invalidnost, hronične bolesti, hipoksiju, genetske poremećaje ćelija (izmjene), i dovodi do mnogih kancerogenih bolesti. Nažalost, izazivanje odgovora antitijela na patogen je jednako kao ostaviti po strani konjicu na bojnem polju, i vojnici koji su na zemlji – pješadija moraju podnijeti taj nemar i povećati napore i svoju brojnost da bi uspješno vodili rat. Ono što je ključno jeste da bijela krvna zrnca – pješadija, izazivaju odgovor koji dovodi do oštećenja, a ne patogeni kao takvi. Mi izazivamo imunu toleranciju masama sa višestrukim ponavljanjem programa vakcinacije, u koje su dodani razni dodaci tzv. ađuvanti. Svaka od ovih aktivnosti povećava nespecifični imuni odgovor, smanjuje zeta potencijal, uzrokuje mikro i makroskopska zgrušavanja (koagulacije), kao dio normalnog procesa liječenja tijela od ovih napada vakcinama kod svih sisara. Tako da ono što izaziva bolesti je upravo ova faza samoizliječenja i popravke tkiva, krvi i organa u uslovima hiperstimulacije.

Neutrofili, aluminijum i demencija

Naše tijelo proizvodi dnevno više od 10 triliona bijelih krvnih zrnaca tzv. neutrofila, naših vojnika u stanju rata u tijelu. Neutrofili imaju životni vijek šest sati (6 sati). Oni su rođeni da umru. U bitci bijela krvna zrnca

mogu izazvati znatnu kolateralnu štetu, pogotovo ako su hiperstimulisana, ili vode rat na više polja i sa više „bataljona“ u produženom vremenskom razdoblju. Dodaci u vakcinama kao što je aluminijum povećavaju broj „bataljona“, šire rat i produžuju ga za nekoliko mjeseci i godina. Aluminijum kao i svaka druga supstanca u bilo kojem tkivu, jednom kada uđe u mozak, uzrokuje tiha i spora neuro-oboljenja kao i demenciju tipa alchajmera. Demencija se javlja kao kolateralna šteta beskrajnog rata, koji se vodi između bijelih krvnih zrnaca i njihovih neprijatelja, u ovom slučaju to su teški metali, za koje bijela krvna zrnca nemaju oružje da ih unište, iako pokušavaju neprestano. Ovo je enzimska bitka koja polahko razjeda mozak i tkiva mozga, hipoksijom i oštećenjima krvnih sudova i tkiva. Ovo je MASS. Ovo je obimni vaskularni dinamični fluidni problem, u funkciji nespecifičnog imunog odgovora i rata na stranu supstancu koju tijelo ne može odstraniti niti uništiti.

Zaključak

Ne uzrokuje mikrovaskularna oštećenja poseban mikrob odnosno klica kroz tijelo. Nego je to odgovor tijela na bilo koju stranu supstancu koja uđe u tijelo. To je nespecifični imuni odgovor. MASS je opšti odgovor uključen u proces popravke i liječenja organa i tkiva. MASS je zajednički i uobičajeni odgovor za sve patogene i strane supstance (entitete) koji uđu u tijelo. Oštećenja koja izaziva MASS su kumulativna, kada je MASS aktiviran sistematski. Mnogobrojni organi bivaju oštećeni MASS procesom, ishemijom i to klinički neprimjetnim putevima.

Drugi dio

Utvrdili smo bez ikakve sumnje, dakle bez trunke sumnje da *sve vakcine izazivaju oštećenja i nanose štetu* i to svima onima koji ih prime bez izuzetka! Sve vakcine izazivaju ishemijski nedostatak protoka krvi kod svih, bez izuzetka!

Tromboza ili zgrušavanje krvi je rezultat izmjena u protoku krvi, zatim rezultat povrede endotelijuma (unutrašnje linije krvnih sudova – zidovi krvnih sudova), ili izmjene u sastavu krvi, odnosno formiranju krvnih ugrušaka. Tromboza je sastavni dio popravljavanja i samoizliječenja tkiva i krvnih sudova. Trombi (ugrušci) mogu biti veći ili manji (mikroskopski). *Mikroskopski trombi izazivaju spektar autizma!* Ako krvni ugrušak začepi više od 75% unutrašnjeg dijametra krvnog suda, onda je opskrba kisikom oštećena i rizik od udara je povećan.

Ishemijski udar je opšti pojam koji znači da je potreba za kisikom veća od raspoloživog kisika, i može se dogoditi BILO GDJE – SVUGDJE u tijelu, a ne samo u mozgu. MASS odgovor koji izaziva oštećenja, a iniciran je vakcinama, izaziva oštećenja autizma i druge bolesti. MASS odgovor je povratan, nestalan i kumulativan, i nemoguće ga je klinički opaziti. To je prolazni mikroskopski proces i ne može se vidjeti biopsijom ili pod mikroskopom. Proces ima otiske – tragove, a neke od njih sada možemo i vidjeti. Neurokognitivne i govorne funkcije od MASS procesa mogu biti oporavljene. Međutim, oporavak može biti spriječen, smanjen ili oštećen sa povratnim MASS epizodama, kao i sa samim procesom izliječenja ili pogrešnim interevencijama u pogrešno vrijeme.

Zbog ovih razloga medicinska nauka nije mogla shvatiti „šta uzrokuje autizam“, ili kako druge bolesti poput polija ili tetanusa uzrokuju paralizu i encefalitis. Ili pak kako španski grip uzrokuje smrt? Sve dok medicinska nauka ne zna uzrok, u fiziologiji, oni ne znaju ni kako liječiti i tretirati problem.

Ustvari cijela zapadna medicina pada kod MASS poremećaja na dva fronta: 1) MASS se javlja kod svih, a kampanje vakcinacije su uzrokovale MASS poremećaje; 2) Ne postoji takva pilula koja bi odgovarala svima, i to tako da povрати multi-sistemska oštećenja koja je alopatska medicina uzrokovala u praksi, uključujući spektar autizma.

MASS mijenja sve

MASS je klinički neprimjetan, ali kada se desi, on je tu pred našim očima, što najbolje možemo vidjeti kod djece koja su dobila dijagnozu spektra autizma. Jednom, kada se šteta izazove (tzv. početno oštećenje), onda nije potrebna daljnja vakcinacija da izazove veću štetu. Većina djece vremenom biva injektovana vakcinama koje sadrže oko 150 stranih antigena. Ako znamo da MASS proces izaziva bilo koje strano tijelo i susptanca u organizmu, onda višestruki toksini u vakcinama, uključujući aluminijum, tkiva abortiranih fetusa, konzervansi i tome slično, samo povećavaju opšti (generalni) MASS imuni odgovor koji izaziva oboljenja na mikrocirkularnom nivou. Spektar autizma može biti popravljen i izliječen. Međutim, ovaj popravak ne dolazi od određenog lijeka, nego djelujući i ciljajući na preokret u postepenim mudrim koracima kroz višestruka fiziološka „iskliznuća“ kroz više organa

u tijelu koja je MASS odgovor prouzrokovao. Moramo znati šta je ovaj patofiziološki proces učinio mozgu, jetri, crijevima, bubrezima, koštanoj srži, imunom i endokrinom sistemu.

Mikroupale i mikrovaskularni ugrušci

Upala je odgovor tijela na infekciju ili iritaciju. Otkrili smo da su bijela krvna zrnca upletena i koordiniraju svoju aktivnost dajući signale jedni drugima sa hemikalijama koje se zovu citokini. Ove hemikalije signaliziraju bijelim krvnim zrnima da napadnu uljeza (klice, mikrobe), ili da se okupe oko stranog tijela i pomjere ga ka površini kože. Sada znamo da postoje niski nivoi ovih hemijskih signala kroz čitavo tijelo i u svako vrijeme. Naučnici ovo stanje nazivaju mikro upalama ili hroničnim sistemskim upalama.

Višestruke ponavljane vakcinacije su *mikrobiološki rat* koji ima svoju cijenu. Ako je odbrambeni odgovor prevelik, produžen ili prečesto aktiviran, dešavaju se oštećenja i „trošenja“ na nivou arterijsko-vaskularne mreže u tijelu. Ovo uzrokuje MASS poremećaje, spektar autizma i mnoga druga oboljenja. Bilo šta „strano“ ubačeno u tijelo izaziva određeni oblik i stepen upale, i bijela krvna zrnca su bez izuzetka uključena u taj proces. Najčešći zajednički uzrok smanjenog protoka krvi je oštećenje arterija. Svi krvni sudovi su obloženi specijalnim ćelijama koje se nazivaju endotelijske ćelije, tzv. endotelijum. Endotelijum je organ sam za sebe, kojim je obložena svaka arterija, vena, kapilar i srce u tijelu. Kao i svaki drugi organ on stari i može biti oštećen. Mikroupala je glavni faktor koji uzrokuje ovo oštećenje. Ponavljano vakcinisanje je

glavni faktor koji uzrokuje mikrozapaljenje. Strane supstance (uključujući vakcine, toksine, infektivne bolesti i teške metale) koje uđu u tijelo, u zidove krvnih sudova ili tkiva vode do stepena „procesa lanačnog kolutanja“. Ovako bijela krvna zrnca migriraju u područje gdje vode rat protiv bilo koje strane supstance koja uđe u tijelo. Oštećenja krvnih sudova nastaju u različitim dijelovima tijela kod različitih ljudi. Kada se to desi u arterijama koje opskrbljuju mozak, to dovodi do demencije (gubitka pamćenja), ili do ishemijskog udara. Udar može biti veliki, pokazujući klasične karakteristike udara (gubitak govora, slabost jedne strane tijela, poremećaj čula i osjetila, pad ivice usta, utrnulost – ukočenost lica), ili udar može biti klinički neprimjetan. Primjetite i zapamtite da su *bijela krvna zrnca fiziološki veća od crvenih krvnih zrnaca*. Ovo je važno u smislu tihe patologije (oboljenja) uzrokovane vakcinama, spektra autizma, iznenadne smrti bebe i neuropsiholoških poremećaja generalno. Upravo, ovaj jednostavni raskorak u veličini krvnih zrnaca je krucijalan za mnoge ljudske bolesti povezane sa MASS odgovorom u tijelu. Crvena krvna zrnca se mogu saviti na pola pri prolasku kroz najsitnije krvne sudove. Bijela krvna zrnca to ne mogu.

Autizam, neuorološki poremećaji i povezanost sa vakcinama

Stečeni spektar autizma i neurodegenerativni poremećaji su najbolji pokazatelj oštećenja na mikro-cirkularnom nivou, odnosno oštećenja mikro-kapilarne mreže krvnih sudova kroz cijelo tijelo. Mikrovaskularna ishemija, hipoksija, anoksija i mikro-tromboze su uzročnici poremećaja nazvanog spektar autizma. Ovo sam objasnio kroz proces MASS-a koji se dešava u tijelu. Pošto je dio problema spektra autizma, fiziološki,

nivo začepljenja mikro sitnih kapilara odnosno krvnih sudova i oštećenje endotelijuma, razumno je špekulisati da je pojava autizma kod djevojčica manja zbog toga što imaju veći stepen zaštite krvnih sudova zbog estrogena čak i u ranim fazama života. Na primjer, rizik od srčanog i moždanog udara je veći kod muškaraca nego kod žena, sve dok žene ne dostignu vrijeme menopauze i izgube zaštitu od estrogena. Poslije menopauze nema razlike u riziku.

MASS je sistemski proces. Jačina, frekvencija, intenzitet i dužina odvojenih MASS epizoda stvaraju zbirna i kumulativna „iskliznuća“ na završecima mikrovaskularnih krvnih sudova. *Nijedan organ u tijelu nije pošteđen.* Organi koji zahtijevaju mnogo kisika, kao što su jetra i mozak su posebno izloženi oštećenjima i promjenama tokom MASS procesa. Zone u mozgu bivaju oštećene, duž cijelog mozga, i to uzrokuje pojavu spektra autizma i mnogo drugih neurodegenerativnih i neuropsihijatrijskih poremećaja. Udare i poremećaje izazvane MASS procesom ne uzrokuje neki posebni mikrob odnosno klica. To je nespecifični imuni odgovor na bilo koju stranu supstancu koja se ubaci (ubrizga) u krv, ili tkiva sisara, što pokreće MASS proces, dovodeći do kolapsa mikrovaskularne mreže kapilara. Svi organi su zahvaćeni.

„Vakcine izazivaju spektar autizma, mnoga neurološka oboljenja, sindrom iznenadne smrti djeteta, navodni sindrom trešenja djeteta, epileptične napade, poremećaj nedostaka pažnje, poremećaje pri učenju i govoru, tihe (neprimjetne) ishemijske udare, krvne ugruške, i mnogo drugog mnogim organima u tijelu.“ (Andrew Moulden)

Oštećenja organa u tijelu mogu biti različita, pa čak dovesti i do smrti ili prestanka rada određenog organa. Ovo najčešće pogađa bubrege,

pluća, jetru i mozak. Dakle, neke posebne klice ili mikrobi nisu ti koji izazivaju bolesti, nego bolesti izaziva generični (opšti) imuni odgovor na stranu supstancu koja se injektira u tijelo.

Globalna vakcinacija: profitabilni koktel za koga?

Čineći stvari još gorim, svaka strana supstanca, mrtva ili živa, koja se nalazi u vakcini, uključujući aluminijum, živu, formaldehid, ljudske i životinjske ćelije i druge toksine, svaka od navedenih pokreće MASS odgovor, i to svaka na sebi svojstven način. Težina i snaga MASS procesa određuje vrstu bolesti. Oštećenja, bolesti i poremećaji koji se dešavaju su u funkciji hiper stimulisanog odgovora bijelih krvnih zrnaca. Ovo je tzv. „prijateljsko pucanje – prijateljska paljba“, i nastaje kolateralna šteta kao proizvod rata koji se vodi na mikroskopskom nivou duž i kroz cijelo tijelo. *Sve vakcine izazivaju rat u tijelu.* Ovaj rat, odnosno odgovor našeg tijela na strane supstance uzrokuje invalidnosti, oštećenja, hronične bolesti, mnoge vrste kancera i smrt. Ne izazivaju bolesti i poremećaje patogeni, nego odgovor našeg tijela na strane supstance. Oštećenja koja nastaju kao produkt MASS procesa u tijelu su kumulativna, jer je MASS sistemski aktiviran. Više organa ili nekad svi organi su zahvaćeni i oštećeni ovim procesom ishemije (nedostatka krvi) i to na klinički tih odnosno neprimjetan način.

Metode otkrivanja neurovaskularnih efekata MASS procesa u tijelu

Sada možemo indirektno vidjeti MASS proces kroz naš neinvazivni sistem mjerenja tzv. BrainguardMD. Možemo vidjeti klinički neprimjetnu tihu ishemiju i ishemijska oštećenja u mozgu posmatrajući i mjereći neurološke i neurokognitivne funkcije koje su ograničene i povezane sa kapilarnom mrežnom krvnih sudova. Posmatramo ove funkcije u periodu prije i poslije vakcinacije kod svakog pojedinca pojedinačno. Jedini način da vidite MASS proces u stvarnom vremenu je pomoću elektronskog mikroskopa. Rezolucija mora biti uvećana više od 15,000 puta. Međutim, ovaj nivo rezolucije nije moguć kod živih tkiva i organa. Povrh toga, jer je MASS dinamičan proces, jedino se „znakovi/tragovi“ MASS-a mogu vidjeti sa električnim mikroskopom, jer je MASS jedino aktivan u živim tkivima. Sada znamo šta su ovi „znakovi/tragovi.“

Naš jedinstveni, neinvazivni i unaprijeđeni test kranijalnih nerava i neurokognitivnih funkcija temelji se na fotografijama lica osoba, kao i video materijalima. Ovako možemo vidjeti i utvrditi klinički potpuno tihe i neprimjetne posljedice MASS procesa u stvarnom vremenu i retrospektivno. Kroz video snimke i fotografije možemo vidjeti kroz život svake osobe da li postoje ili ne postoje tragovi MASS procesa i dijagnosticirati problem i stanje svake osobe. MASS je medicinski hitno stanje. Kada ustanovimo da je MASS prisutan, to znači da je osoba iskusila tiho ishemijsko oštećenje mozga odnosno moždani udar.

Za osobe koje pate od spektra autizma uzrokovanog MASS procesom, sada možemo potvrditi ili opovrgnuti da su određeni tretmani kao

kelacija, ABA, prepisani lijekovi, dijeta i slično, omogućili oporavak, nisu uradili ništa ili pak pogoršali prvobitno oštećenje mozga. Također, sada možemo dijagnosticirati sindrom iznenadne smrti novorođenčeta (SIDS), dok je sindrom u razvoju, prije nego se desi smrt. Procjenjujemo MASS proces kroz neurovaskularne funkcije koje su selektivno pokvarene, odnosno „izbačene iz kolosijeka“ kroz mikrovaskularne klinički neprimjetne lezije i oštećenja u mozgu i drugim organima. Mjerimo statične i aktivne procese koji zajedno čine našu funkcionalnu sliku. Kada dođe do integracije MASS procesa i neuroloških funkcija, nijedan sistem snimanja (skeniranja) koji postoji u klinikama i bolnicama ne može vidjeti i utvrditi ono što mi možemo vidjeti u potpunosti. Sada možemo vidjeti u stvarnom vremenu ono što hitne pomoći nazivaju „nepoznat uzrok smrti“, uključujući proces iznenadne smrti.

Naš sistem mjerenja i protokola (baziran na posmatranju lica i analize kranijalnih nerava u moždanom stablu) pokazuje da većina oštećenih vakcinama ima iste markere trajnih oštećenja mozga. Kako kod djece tako i kod odraslih. Kod ovih osoba oštećenih vakcinama je kasnije dijagnosticiran spektar autizma, SIDS, poremećaj pažnje i učenja, gubitak govora i širok raspon drugih neurokognitivnih problema. Ovo pokazuje da su patološki mehanizmi isti kod svih vakcina. Različiti klinički simptomi i dijagnoze zavise od toga koji je dio mozga oštećen. Pokazali smo oštećenja mozga nastala nakon vakcinacija kod osoba koristeći se fotografijama koje su nastale prije vakcinisanja kao referentnu tačku. Pronašli smo neurološka i neurovaskularna MASS procesom uzrokovana oštećenja, a to su:

Gardasil vakcina i s njom povezana oštećenja i smrt;

Vakcina protiv hepatitisa A/B i oštećenja kod odraslih;

Oštećenja i smrt uzrokovana vakcinama MMR, DtaP, HiB, Prevnar kod beba i djece;

Poremećaji pažnje i iznenadna smrt izazvana vakcinama;

Gulf War sindrom kod vojnika koji su primili vakcinu protiv antraksa.

Vododjelna vaskularna područja i sindromi diskonekcije

Najteže pogođena područja MASS procesom su vododjelna vaskularna područja mreže kapilara. Oštećenja su kumulativna kao sindromi poslije udaraca, najčešće vidljivi kod boksera. Zaista, MASS je temeljni proces u razvoju parkinsonove i alzhajmerove bolesti kao i šizofrenije. Mehanizam nastanka povreda i oštećenja je isti, premda okidači i zahvaćene regije u mozgu mogu biti različiti kod svakog različitog poremećaja.

U mozgu MASS stvara sindrome diskonekcija (prekide), kao što su spektar autizma, nemogućnost učenja, poremećaj pažnje i učenja, govora, sindrom centralnog bola, gubitak osjećaja i senzornih mehanizama. Sada možemo vidjeti da neurološka oštećenja koja su nastala kao posljedica ishemije mikro-kapilarnih krvnih sudova, dešavaju se i nastaju nakon primanja gardasil vakcine kod djevojaka, vakcine protiv gripa kod odraslih i vakcina hepatitis A/B, i to kroz cijeli život. Bez obzira na krajnju dijagnozu, ili primljenu vakcinu, temeljni

mehanizam oštećenja na nivou tkiva i organa je identičan i zajednički za sve, a to su oštećenja mikro-vaskularnih krvnih sudova.

Sada je na nama da odlučimo šta ćemo uraditi sa znanjem i informacijama koje su dostupne i stoje nam ravno pred očima, i to pred svima nama. Dokazi su jednostavni, pogledajte i uvjerite se sami: „Vakcine su uzrokovale ishemiju i oštećenja svima nama bez izuzetka, uljučujući spektar autizma, poremećaje pri učenju i govoru, demenciju, sindrom iznenadne smrti i tako dalje.

Vakcine izazivaju klinički neprimjetne odnosno tihe ishemijske udare kroz MASS proces, bilo trenutno, ili pak zakašnjelom reakcijom i odgovorom našeg tijela na strane supstance. Pronašli smo nove načine da otkrijemo suptilne paralize i neurovaskularne lezije. Dvije paralize su prilično vidljive golim okom ako znate pažljivo posmatrati i šta posmatrati. To su:

- 1.) Šesti (6) kranijalni nerv i njegov klinički znak je ezotropija, razrokost (devijacija-okretanje oka prema unutra, prema nosu);
- 2.) Sedmi (7) facijalni kranijalni nerv i njegov klinički znak je poravnanje nagiba na obrazu između nosa i gornje usne (paraliza tog dijela), i pad ivice usta (nakrivljena usta) odnosno iskrivljen osmijeh.

Izabrao sam ova dva kranijalna nerva kao imperativ da žrtve vakcina i njihove porodice, doslovce „vide lično“ i uvjere se sami šta sve vakcine čine svima nama.

MASS problem ostaje u fiziologiji čak i ako se obustavi upotreba vakcina u budućnosti.

Neurološke lezije i oštećenja koja otkrijemo su u više dijelova i regija mozga i moždanog stabla. Najčešće pogađaju vododjelna područja kao i krajeve arterija. Dešifrovali smo kritične korake u fizilogiji MASS procesa, dio u mikrobiologiji, neuroimunologiji, koloidnim solucijama i fluidnom dinamikom, kao i hemodinamikom i zaliječenjem tkiva. Nismo spremni objaviti ove informacije dok ne potvrdimo specifične intervencije i tretmane za konkretne slučajeve.

Na ovom mjestu gdje se trenutno nalazimo važnije je zaustaviti ovaj masakr, da se ne nastavi dalje, nego se fokusirati na čišćenje i popravak. Oporavićemo se ali prije toga moramo zaustaviti ovaj masakr zajedno, moramo se udružiti, ili ćemo izgubiti ovu bitku a i rat.

Sve vakcine izazivaju ishemijske udare i hronična oboljenja

Otkrili smo da vakcine, od onoga od čega su napravljene, izazivaju tihe (neprimjetne) ishemijske udare. To obuhvata širok dijapazon oboljenja koja izgledaju različito: autizam, sindrom iznenadne smrti djeteta, poremećaj nedostatka pažnje, poremećaji pri učenju i govoru, oštećenja mozga, oštećenja organa, demencija, navodni sindrom trešenja djeteta, krvne ugruške, gubitak sluha, sljepilo, dijabetes, otkazivanje bubrega, smrt, i kumulativna iskliznuća neurovaskularnih struktura svih organa a posebno mozga kroz klinički neprimjete nastupe. Dakle, ovi ishemijski udari su neprimjetni. Pokazali smo i otkrili kroz naše metode, da udari nastaju kroz nekoliko sati i dana poslije vakcinacije neprimjetno.

Zaključak

Vakcine izazivaju klinički neprimjetne mikroskopske ishemijske udare kod svih bez izuzetka. Svi sisari su ugroženi i pogođeni na isti način. Raspon oštećenja varira od osobe do osobe. Ova patološki proces sam nazvao MASS (M-Moulden, A-Anoksija, S-Spektar, S-Sindrom). Dakle, MASS je nespecifični, generalni, opšti ćelijski imuni odgovor na strane supstance koje uđu u tkiva ili krvni sistem kod sisara. MASS je dio našeg procesa samoizliječenja za bilo koje oštećenje tkiva i imuno stimulacije. MASS se aktivira tokom svih vrsta hiperstimulacija imunog sistema, od astme, do vaskulitisa i serum oboljenja. Mi smo u ratu sa onima koji su izabrali da zarađuju na našoj patnji i boli. Ovo je rat!